

Persbericht

Maïsoogst 2014 gekenmerkt door verhoogde mycotoxinegehaltenes

Brussel, 08/12/2014

De goede maïsoogst wordt dit jaar gekenmerkt door verhoogde gehaltenes aan mycotoxinen. Waakzaamheid is dan ook geboden! Dit is de conclusie van de monitoring die BEMEFa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, in samenwerking met Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars) uitvoerde. Deze jaarlijkse monitoring richt zich specifiek op de aanwezigheid van mycotoxinen in maïs onmiddellijk na de oogst. Met 3 keer meer analyseresultaten dan in 2013, kan de sector een betrouwbaar beeld vormen van het contaminatieniveau voor mycotoxinen in maïs van vooral Belgische en Franse origine. Eenzelfde trend blijkt voor maïs afkomstig uit Nederland en Duitsland.

Mycotoxinen zijn giftige stoffen (toxinen) die door schimmels worden geproduceerd en bij haast alle graansoorten voorkomen. Ze worden op het veld gevormd tijdens de groei van het gewas, na de oogst, of tijdens de opslag. Op het veld zijn het vooral factoren zoals vochtige weersomstandigheden, rassenkeuze en de bodembewerking die de ontwikkeling van mycotoxinen stimuleren. Daarom nemen Bemefa en Synagra extra analyses op in hun bemonsteringsplan om ook voor maïs het mycotoxinegehalte te bepalen en zo eventuele problemen op voorhand in te schatten.

Het Early Warning Systeem (EWS) is een initiatief dat jaarlijks voorzien wordt naast het lopende monitoringplan. Hierbij worden onmiddellijk na de oogst gegevens verzameld over maïs van Belgische origine en maïs uit de ons omringende landen, om vervolgens analyseresultaten ter beschikking te stellen aan de verbruikers van maïs. Dankzij de medewerking van de leden van Bemefa en Synagra werden er voor 2014 **158 monsters** onmiddellijk na de maïsoogst geanalyseerd. Dit is 3 keer meer dan in 2013!

De uitstekende groeicyclus van maïs heeft ervoor gezorgd dat er in 2014 uitzonderlijke opbrengsten werden behaald. Maar in vergelijking met de voorgaande jaren tonen de analyseresultaten hogere contaminaties van DON en ZEA aan, wat de sector toeschrijft aan het vochtige en warme weer tijdens de bloeiperiode. Ook al werden er geen overschrijdingen van de indicatieve richtwaarden vastgesteld op niveau van voedermiddelen, roept de sector op tot voorzichtigheid. “De analyseresultaten tonen dit jaar duidelijk verhoogde waarden aan voor DON en ZEA. Nu de prijsrelatie tussen tarwe en maïs eerder de consumptie van maïs aantrekt, is het toch oppassen dat op voederniveau de aanbevolen richtwaarden niet overschreden worden. Een regelmatige monitoring is dus aanbevolen”, aldus Yvan Dejaegher, Directeur-Generaal van Bemefa. Volgens de sector is het vooral opletten bij formuleringen waar veel granen (tarwe, maïs en bijproducten ervan) in zijn opgenomen.

Voor de fumonisines, HT2, T2, Aflatoxine B1 en OTA zijn de resultaten positief. Deze mycotoxines werden niet of in lage gehaltenes teruggevonden in de maïsstalen. “We willen ook nog wijzen op het gevaar van OTA en het belang hierbij om zeker te zorgen voor goede opslagpraktijken en voldoende

afkoeling en ventilatie na droging”, aldus Dejaegher. Voor het gedetailleerde overzicht van de analyseresultaten verwijzen we graag naar het sectoroverzicht beschikbaar op de website www.bemefa.be.

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

- De heer Yvan Dejaegher, Directeur-generaal en woordvoerder van Bemefa
Tel: 32 (0)2 512 09 55 of 32 (0)477 31 88 75
- De heer Jean Maertens, Voorzitter en woordvoerder van Synagra
Tel: 32 (0)2 512 15 50